

```

a=axis;
axis([min(a([1,3]))-1,max(a([2,4]))+1,min(a([1,3]))
-1,max(a([2,4]))+1])
axis square
grid on
title('P es la proyeccion de u en v')
xlabel('u termina en 1, v termina en 2, P termina en 3')

```

Una vez que se ha escrito la función en un archivo con nombre `prjtn` dé el comando `doc prjtn` para tener una descripción de este archivo con extensión `m`.

Para los pares de vectores \mathbf{u} y \mathbf{v} dados enseguida:

- Introduzca \mathbf{u} y \mathbf{v} como matrices de 2×1 y calcule \mathbf{p} = proyección de \mathbf{u} sobre \mathbf{v} .
- Dé el comando `prjtn(u, v)` (este archivo despliega \mathbf{u} y \mathbf{v} en la pantalla de gráficas. Oprima cualquier tecla y bajará una perpendicular del punto terminal de \mathbf{u} hasta la recta determinada por \mathbf{v} . Oprima cualquier tecla y se indicará el vector proyección).
- Mientras observa las gráficas en la pantalla, verifique que el vector \mathbf{p} graficado sea el vector calculado en *a*). Localice el vector (paralelo a) $\mathbf{u} - \mathbf{p}$. ¿Cuál es la relación geométrica entre $\mathbf{u} - \mathbf{p}$ y \mathbf{v} ?

i. $\mathbf{u} = [2;1]$ $\mathbf{v} = [3;0]$

ii. $\mathbf{u} = [2;3]$ $\mathbf{v} = [-3;0]$

iii. $\mathbf{u} = [2;1]$ $\mathbf{v} = [-1;2]$

iv. $\mathbf{u} = [2;3]$ $\mathbf{v} = [-1;-2]$

- Elija sus propios vectores \mathbf{u} y \mathbf{v} (al menos tres pares).

3.3 VECTORES EN EL ESPACIO

Se ha visto que cualquier punto en el plano se puede representar como un par ordenado de números reales. De manera análoga, cualquier punto en el espacio se puede representar por una **terna ordenada** de números reales

$$(a, b, c) \tag{1}$$



Los vectores de la forma (1) constituyen el espacio \mathbb{R}^3 . Para representar un punto en el espacio, se comienza por elegir un punto en \mathbb{R}^3 . Se denomina a este punto el **origen**, denotado por 0. Después se dibujan tres rectas perpendiculares entre sí, a las que se llama el **eje x**, el **eje y** y el **eje z**. Dichos ejes se pueden seleccionar de diferentes formas, pero la más común tiene los ejes x y y horizontales y el eje z vertical. Sobre cada eje se elige una dirección positiva y la distancia a lo largo de cada eje se mide como el número de unidades en esta dirección positiva a partir del origen.

Los dos sistemas básicos para dibujar estos ejes se describen en la figura 3.18. Si los ejes se colocan como en la figura 3.18a, entonces el sistema se denomina **sistema derecho**; si se colocan como en la figura 3.18b, se trata de un **sistema izquierdo**. En las figuras las flechas indican la dirección positiva de los ejes. La razón para la elección de estos términos es la siguiente: en un sistema derecho, si coloca su mano derecha de manera que el dedo índice señale en la dirección positiva del eje x mientras que el medio apunta en la dirección positiva del eje y , entonces su pulgar apuntará en la dirección positiva del eje z . Este concepto se ilustra en la figura 3.19.

La misma regla funciona para el sistema izquierdo con los dedos de la mano izquierda. En el resto de este libro se seguirá la práctica común de describir los ejes de coordenadas usando un sistema derecho.

Figura 3.18

- a. Un sistema derecho;
b. Un sistema izquierdo





Figura 3.19

La mano derecha indica las direcciones de un sistema derecho



PLANOS COORDENADOS

Los tres ejes en nuestro sistema determinan tres **planos coordenados**, que se denominan plano xy , plano xz y plano yz . El plano xy contiene los ejes x y y y es simplemente el plano con el que se ha venido trabajando hasta ahora en la mayor parte del libro. Se puede pensar en los planos xz y yz de modo similar.

Al tener nuestra estructura construida de ejes coordenados y planos, podemos describir cualquier punto P en \mathbb{R}^3 de una sola manera:

$$P = (x, y, z) \quad (2)$$

en donde la primera coordenada x es la distancia dirigida del plano yz a P (medida en la dirección positiva del eje x a lo largo de una recta paralela al eje x), la segunda coordenada y es la distancia dirigida desde el plano xz hasta P (medida en la dirección positiva del eje y y a lo largo de una recta paralela al eje y) y la tercera coordenada z es la distancia dirigida desde el plano xy hasta P (medida en la dirección positiva del eje z y a lo largo de una recta paralela al eje z).

En este sistema los tres planos coordenados dividen al espacio \mathbb{R}^3 en ocho **octantes**, de la misma forma que en \mathbb{R}^2 los ejes coordenados dividen al plano en cuatro cuadrantes. El octante en el que los tres ejes coordenados son positivos siempre se selecciona como el primero.

El sistema coordenado que acaba de establecerse con frecuencia se conoce como **sistema de coordenadas rectangulares** o **sistema de coordenadas cartesianas**. Una vez que la noción de describir un punto en este sistema le resulte familiar pueden extenderse muchas de las ideas a partir del plano.

TEOREMA 1 Sean $P = (x_1, y_1, z_1)$ y $Q = (x_2, y_2, z_2)$ dos puntos en el espacio. Entonces la distancia \overline{PQ} entre P y Q está dada por

$$\overline{PQ} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2} \tag{3}$$

Se pide al lector que pruebe este resultado en el problema 49.

EJEMPLO 1 Cálculo de la distancia entre dos puntos en \mathbb{R}^3

Calcule la distancia entre los puntos $(3, -1, 6)$ y $(-2, 3, 5)$.

■ ■ **Solución**

$$\overline{PQ} = \sqrt{[3 - (-2)]^2 + (-1 - 3)^2 + (6 - 5)^2} = \sqrt{42}$$

En las secciones 3.1 y 3.2 se desarrollaron las propiedades geométricas de los vectores en el plano. Dada la similitud entre los sistemas de coordenadas en \mathbb{R}^2 y \mathbb{R}^3 , no es una sorpresa que los vectores en \mathbb{R}^2 y \mathbb{R}^3 tengan estructuras muy similares. Ahora se desarrollará el concepto de un vector en el espacio. El desarrollo seguirá de cerca los avances de las últimas dos secciones y, por lo tanto, se omitirán algunos detalles.

SEGMENTO DE RECTA DIRIGIDO
VECTOR EN \mathbb{R}^3

Sean P y Q dos puntos distintos en \mathbb{R}^3 . Entonces el **segmento de recta dirigido** \overrightarrow{PQ} es el segmento de recta que se extiende de P a Q . Dos segmentos de recta dirigidos son **equivalentes** si tienen la misma magnitud y dirección. Un **vector en \mathbb{R}^3** es el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta dirigido dado, y cualquier segmento dirigido \overrightarrow{PQ} en ese conjunto se llama una **representación** del vector.

Hasta aquí las definiciones son idénticas. Por conveniencia, se elige P en el origen para poder describir el vector $\mathbf{v} = \overrightarrow{0Q}$ mediante las **coordenadas** (x, y, z) del punto Q .

Entonces la **magnitud** de $\mathbf{v} = \overrightarrow{0Q}$ es $|\mathbf{v}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ (del teorema 1).

EJEMPLO 2 Cálculo de la magnitud de un vector en \mathbb{R}^3

Sea $\mathbf{v} = (1, 3, -2)$. Encuentre $|\mathbf{v}|$.

■ ■ **Solución**

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{1^2 + 3^2 + (-2)^2} = \sqrt{14}.$$

Sea $\mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1)$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2, z_2)$ dos vectores y sea α un número real (escalar). Entonces se define


Suma de vectores y multiplicación por un escalar en \mathbb{R}^3

$$\begin{aligned} \mathbf{u} + \mathbf{v} &= (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \\ \alpha \mathbf{u} &= (\alpha x_1, \alpha y_1, \alpha z_1) \end{aligned}$$

Ésta es la misma definición de suma de vectores y multiplicación por un escalar que se tenía; se ilustra en la figura 3.20.

Figura 3.20

Ilustración de la suma de vectores y la multiplicación por un escalar en \mathbb{R}^3



VECTOR UNITARIO

Un **vector unitario** \mathbf{u} es un vector con magnitud 1. Si \mathbf{v} es un vector diferente de cero, entonces $\mathbf{u} = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$ es un vector unitario que tiene la misma dirección que \mathbf{v} .

EJEMPLO 3

Cálculo de un vector unitario en \mathbb{R}^3

Encuentre un vector unitario que tenga la misma dirección que $\mathbf{v} = (2, 4, -3)$.

Solución

Como $v = \sqrt{2^2 + 4^2 + (-3)^2} = \sqrt{29}$ se tiene

$$\mathbf{u} = (2/\sqrt{29}, 4/\sqrt{29}, -3/\sqrt{29})$$

Ahora se puede definir formalmente la dirección de un vector en \mathbb{R}^3 . No se puede definir como el ángulo θ que forma el vector con el eje x positivo ya que, por ejemplo, si $0 < \theta < \pi/2$, por lo que existe un número infinito de vectores que forman un ángulo θ con el lado positivo del eje x , y estos vectores juntos forman un cono (vea la figura 3.21).

DEFINICIÓN 1

Dirección en \mathbb{R}^3

La **dirección** de un vector \mathbf{v} en \mathbb{R}^3 se define como el vector unitario $\mathbf{u} = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$.

Figura 3.21

Todos los vectores que están en este cono forman un ángulo θ con la parte positiva del eje x





Figura 3.22

El vector \mathbf{v} forma un ángulo α con el lado positivo del eje x , β con el lado positivo del eje y y γ con el eje positivo del eje z .



Observación. Se pudo haber definido la dirección de un vector \mathbf{v} en \mathbb{R}^2 de esta manera, ya que si $\mathbf{u} = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$, entonces $\mathbf{u} = (\cos \theta, \sin \theta)$, donde θ es la dirección de \mathbf{v} .

Resultaría satisfactorio definir la dirección de un vector \mathbf{v} en términos de algunos ángulos. Sea \mathbf{v} el vector \overrightarrow{OP} descrito en la figura 3.22. Definimos α como el ángulo entre \mathbf{v} y el eje x positivo, β el ángulo entre \mathbf{v} y el eje y positivo, y γ el ángulo entre \mathbf{v} y el eje z positivo. Los ángulos α , β y γ se denominan **ángulos directores** del vector \mathbf{v} . Entonces, de la figura 3.22,

ÁNGULOS DIRECTORES

$$\cos \alpha = \frac{x_0}{|\mathbf{v}|} \quad \cos \beta = \frac{y_0}{|\mathbf{v}|} \quad \cos \gamma = \frac{z_0}{|\mathbf{v}|} \quad (4)$$

Si \mathbf{v} es un vector unitario, entonces $|\mathbf{v}| = 1$ y

$$\cos \alpha = x_0, \quad \cos \beta = y_0, \quad \cos \gamma = z_0 \quad (5)$$

COSENOS DIRECTORES

Por definición, cada uno de estos tres ángulos cae en el intervalo de $[0, \pi]$. Los cosenos de estos ángulos se denominan **cosenos directores** del vector \mathbf{v} . Observe, de la ecuación (4), que

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \frac{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}{|\mathbf{v}|^2} = \frac{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2} = 1 \quad (6)$$

Si α , β y γ son tres números cualesquiera entre cero y π tales que satisfacen la condición (6), entonces determinan de manera única un vector unitario dado por $\mathbf{u} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$.

NÚMEROS DIRECTORES

Observación. Si $\mathbf{v} = (a, b, c)$ y $|\mathbf{v}| \neq 1$, entonces los números a , b y c se llaman **números directores** del vector \mathbf{v} .

EJEMPLO 4

Cálculo de los cosenos directores de un vector en \mathbb{R}^3


Encuentre los cosenos directores del vector $\mathbf{v} = (4, -1, 6)$.

■ Solución

La dirección de \mathbf{v} es $\mathbf{v}/|\mathbf{v}| = \mathbf{v}/\sqrt{53} = (4/\sqrt{53}, -1/\sqrt{53}, 6/\sqrt{53})$. Entonces $\cos \alpha = 4/\sqrt{53} \approx 0.5494$, $\cos \beta = -1/\sqrt{53} \approx -0.1374$ y $\cos \gamma = 6/\sqrt{53} \approx 0.8242$. Con estos valores se usan tablas o una

Figura 3.23

Los cosenos directores de $(4, -1, 6)$ son $\cos \alpha$, $\cos \beta$ y $\cos \gamma$



calculadora para obtener $\alpha \approx 56.7^\circ \approx 0.989$ rad, $\beta \approx 97.9^\circ \approx 1.71$ rad y $\gamma = 34.5^\circ \approx 0.602$ rad. En la figura 3.23 se presenta un esbozo del vector, junto con los ángulos α , β y γ .

EJEMPLO 5

Cálculo de un vector en \mathbb{R}^3 dados su magnitud y cosenos directores

Encuentre un vector \mathbf{v} de magnitud 7 cuyos cosenos directores son $1/\sqrt{6}$, $1/\sqrt{3}$ y $1/\sqrt{2}$.

Solución

Sea $\mathbf{u} = (1/\sqrt{6}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{2})$. Entonces \mathbf{u} es un vector unitario ya que $|\mathbf{u}| = 1$. Así, la dirección de \mathbf{v} está dada por \mathbf{u} y $\mathbf{v} = |\mathbf{v}|\mathbf{u} = 7\mathbf{u} = (7/\sqrt{6}, 7/\sqrt{3}, 7/\sqrt{2})$.

Nota. Este problema se puede resolver porque $(1/\sqrt{6})^2 + (1/\sqrt{3})^2 + (1/\sqrt{2})^2 = 1$.

Es interesante observar que si \mathbf{v} en \mathbb{R}^2 es un vector unitario y se puede escribir $\mathbf{v} = (\cos \theta)\mathbf{i} + (\sin \theta)\mathbf{j}$, donde θ es la dirección de \mathbf{v} , entonces $\cos \theta$ y $\sin \theta$ son los cosenos directores de \mathbf{v} . En este caso, $\alpha = \theta$ y se define β como el ángulo que forma \mathbf{v} con el eje y (vea la figura 3.24). Por lo tanto, $\beta = (\pi/2) - \alpha$, de manera que $\cos \beta = \cos(\pi/2 - \alpha) = \sin \alpha$ y \mathbf{v} se puede escribir en la forma de “cosenos directores”

$$\mathbf{v} = \cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j}$$

En la sección 3.1 se observó que cualquier vector en el plano se puede escribir en términos de los vectores base \mathbf{i} y \mathbf{j} . Para extender esta idea a \mathbb{R}^3 se define

$$\mathbf{i} = (1, 0, 0) \quad \mathbf{j} = (0, 1, 0) \quad \mathbf{k} = (0, 0, 1) \quad (7)$$

Aquí, \mathbf{i} , \mathbf{j} y \mathbf{k} son vectores unitarios. El vector \mathbf{i} está sobre el eje x , \mathbf{j} sobre el eje y y \mathbf{k} sobre el eje z . En la figura 3.25 se puede ver un bosquejo. Si $\mathbf{v} = (x, y, z)$ es cualquier vector en \mathbb{R}^3 , entonces

Figura 3.24

Si $\beta = \frac{\pi}{2} - \theta = \frac{\pi}{2} - \alpha$ y \mathbf{v} es un vector unitario, entonces

$$\mathbf{v} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j} = \cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j}$$





Figura 3.25

Los vectores base i, j y k en \mathbb{R}^3



$$v = (x, y, z) = (x, 0, 0) + (0, y, 0) + (0, 0, z) = xi + yj + zk$$

Esto es, cualquier vector v en \mathbb{R}^3 se puede escribir de manera única en términos de los vectores i, j y k .

La definición de producto escalar en \mathbb{R}^3 es la definición que se presentó en la sección 1.6. Observe que $i \cdot i = 1, j \cdot j = 1, k \cdot k = 1, i \cdot j = 0, j \cdot k = 0$ e $i \cdot k = 0$.

TEOREMA 2

Si φ denota el ángulo positivo más pequeño entre dos vectores u y v diferentes de cero, se tiene

$$\cos \varphi = \frac{u \cdot v}{|u| |v|} = \frac{u \cdot v}{|u| |v|} \tag{8}$$

DEMOSTRACIÓN

La prueba es casi idéntica a la prueba del teorema 3.2.2 de la página 235 y se deja al lector como ejercicio (vea el problema 50).

EJEMPLO 6

Cálculo del coseno del ángulo entre dos vectores en \mathbb{R}^3

Calcule el coseno del ángulo entre $u = 3i - j + 2k$ y $v = 4i + 3j - k$.

Solución

$u \cdot v = 7, |u| = \sqrt{14}$ y $|v| = \sqrt{26}$, por lo que $\cos \varphi = 7/\sqrt{(14)(26)} = 7/\sqrt{364} \approx 0.3669$ y $\varphi \approx 68.5^\circ \approx 1.2$ rad.

DEFINICIÓN 2

Vectores paralelos y ortogonales

Dos vectores u y v diferentes de cero son:

- i. **Paralelos** si el ángulo entre ellos es cero o π .
- ii. **Ortogonales** (o **perpendiculares**) si el ángulo entre ellos es $\pi/2$.

TEOREMA 3

- i. Si $u \neq 0$, entonces u y v son paralelos si y sólo si $v = \alpha u$ para algún escalar $\alpha \neq 0$.
- ii. Si u y v son diferentes de cero, entonces u y v son ortogonales si y sólo si $u \cdot v = 0$.

DEMOSTRACIÓN

De nuevo la prueba es sencilla y se deja como ejercicio (vea el problema 51).

Ahora se dará la definición de la proyección de un vector sobre otro. Primero se establece el teorema análogo al teorema 3.2.5 (y cuya demostración es idéntica).

TEOREMA 4 Sea \mathbf{v} un vector diferente de cero, entonces para cualquier otro vector \mathbf{u} ,

$$\mathbf{w} = \mathbf{u} - \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2} \mathbf{v}$$

es ortogonal a \mathbf{v} .

DEFINICIÓN 3 **Proyección**

Sean \mathbf{u} y \mathbf{v} dos vectores diferentes de cero. Entonces la **proyección** de \mathbf{u} sobre \mathbf{v} , denotada por $\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$ está definida por

$$\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2} \mathbf{v} \quad (9)$$

La **componente** de \mathbf{u} en la dirección de \mathbf{v} está dada por $\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$. (10)

EJEMPLO 7

Cálculo de una proyección en \mathbb{R}^3

Sean $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 6\mathbf{k}$. Encuentre $\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$.

■ Solución

En este caso $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})/|\mathbf{v}|^2 = 2/41$ y $\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{2}{41}\mathbf{i} + \frac{4}{41}\mathbf{j} - \frac{12}{41}\mathbf{k}$. La componente de \mathbf{u} en la dirección \mathbf{v} es $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})/|\mathbf{v}| = 2/\sqrt{41}$.

Observe que, igual que en el plano, $\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$ es un vector que tiene la misma dirección que \mathbf{v} si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} > 0$ y la dirección opuesta a la de \mathbf{v} si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} < 0$.

Problemas 3.3

AUTOEVALUACIÓN

I. Responda si la afirmación siguiente es falsa o verdadera. La práctica común seguida en este libro es desplegar los ejes xyz para \mathbb{R}^3 como un sistema derecho.

II. La distancia entre los puntos $(1, 2, 3)$ y $(3, 5, -1)$ es _____.

a) $\sqrt{(1+2+3)^2 + (3+5-1)^2}$

b) $\sqrt{2^2 + 3^2 + 2^2}$

c) $\sqrt{2^2 + 3^2 + 4^2}$

d) $\sqrt{4^2 + 7^2 + 2^2}$

III. El punto $(0.3, 0.5, 0.2)$ está _____ la esfera unitaria.

- a) en la tangente a b) sobre
c) dentro de d) fuera de

IV. $(x - 3)^2 + (y + 5)^2 + z^2 = 81$ es la ecuación de la esfera con _____.

- a) centro 81 y radio $(-3, 5, 0)$
b) radio 81 y centro $(-3, 5, 0)$
c) radio -9 y centro $(3, -5, 0)$
d) radio 9 y centro $(3, -5, 0)$

V. $\mathbf{j} - (4\mathbf{k} - 3\mathbf{i}) =$ _____.

- a) $(1, -4, -3)$ b) $(1, -4, 3)$
c) $(-3, 1, -4)$ d) $(3, 1, -4)$

VI. $(\mathbf{i} + 3\mathbf{k} - \mathbf{j}) \cdot (\mathbf{k} - 4\mathbf{j} + 2\mathbf{i}) =$ _____.

- a) $2 + 4 + 3 = 9$
b) $(1 + 3 - 1)(1 - 4 + 2) = -3$
c) $1 + 12 - 2 = -13$
d) $2 - 4 - 3 = -5$

VII. El vector unitario en la misma dirección que $\mathbf{i} + 3\mathbf{k} - \mathbf{j}$ es _____.

- a) $\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$ b) $\frac{1}{5}(2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k})$
c) $\frac{1}{3}(2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k})$ d) $\frac{1}{3}(2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k})$

VIII. El componente de \mathbf{u} en la dirección \mathbf{w} es

- a) $\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}}{|\mathbf{w}|}$ b) $\frac{\mathbf{w}}{|\mathbf{w}|}$ c) $\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} \mathbf{w}}{|\mathbf{w}| |\mathbf{w}|}$ d) $\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} \mathbf{u}}{|\mathbf{w}| |\mathbf{u}|}$

De los problemas 1 al 4 encuentre la distancia entre los puntos:

1. $(3, -4, 3); (3, 2, 5)$ 2. $(3, -4, 7); (3, -4, 9)$
3. $(3, -4, 1); (3, -4, 4)$ 4. $(-2, 1, 3); (4, 1, 3)$

En los problemas 5 al 23 encuentre la magnitud y los cosenos directores del vector dado.

5. $\mathbf{v} = 3\mathbf{j}$ 6. $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$ 7. $\mathbf{v} = -3\mathbf{i}$
8. $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ 9. $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} - \mathbf{j}$ 10. $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$
11. $\mathbf{v} = -3\mathbf{i} - 5\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$ 12. $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$ 13. $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$
14. $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ 15. $\mathbf{v} = -\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ 16. $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}$
17. $\mathbf{v} = 6\mathbf{i} + 7\mathbf{j}$ 18. $\mathbf{v} = -\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$ 19. $\mathbf{v} = -\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$
20. $\mathbf{v} = -\mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}$ 21. $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 7\mathbf{k}$ 22. $\mathbf{v} = -3\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 8\mathbf{k}$
23. $\mathbf{v} = -2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$


24. Los tres ángulos directores de cierto vector unitario son los mismos y están entre cero y $\pi/2$. ¿Cuál es el vector?

25. Encuentre un vector de magnitud 12 que tenga la misma dirección que el vector del problema 24.
26. Demuestre que no existe un vector unitario cuyos ángulos directores sean $\pi/6$, $\pi/3$ y $\pi/4$.
27. Sea $P = (2, 1, 4)$ y $Q = (3, -2, 8)$. Encuentre un vector unitario en la misma dirección de \vec{PQ} .
28. Sea $P = (-3, 1, 7)$ y $Q = (8, 1, 7)$. Encuentre un vector unitario cuya dirección es opuesta a la de \vec{PQ} .
29. En el problema 28 encuentre todos los puntos R tales que $\vec{PR} \perp \vec{PQ}$.
- *30. Demuestre que el conjunto de puntos que satisfacen la condición del problema 29 y la condición $|\vec{PR}| = 1$ forman un círculo.
31. **Desigualdad del triángulo** Si \mathbf{u} y \mathbf{v} están en \mathbb{R}^3 demuestre que $|\mathbf{u} + \mathbf{v}| \leq |\mathbf{u}| + |\mathbf{v}|$.
32. ¿Bajo qué circunstancias puede sustituirse la desigualdad en el problema 31 por un signo de igualdad?

En los problemas 33 a 48 sea $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$, $\mathbf{w} = \mathbf{i} - 7\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ y $\mathbf{t} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$.

33. Calcule $\mathbf{u} + \mathbf{v}$
34. Calcule $2\mathbf{u} - 3\mathbf{v}$
35. Calcule $3\mathbf{u} - 2\mathbf{v}$
36. Calcule $\mathbf{t} + 3\mathbf{w} - \mathbf{v}$
37. Calcule $2\mathbf{u} + 7\mathbf{w} + 5\mathbf{v}$
38. Calcule $\mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v})$
39. Calcule $2\mathbf{v} + 7\mathbf{t} - \mathbf{w}$
40. Calcule $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$
41. Calcule $(3\mathbf{t} - 2\mathbf{u}) \cdot (5\mathbf{v} + 2\mathbf{w})$
42. Calcule $|\mathbf{w}|$
43. Calcule $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} - \mathbf{w} \cdot \mathbf{t}$
44. Calcule el ángulo entre \mathbf{u} y \mathbf{w}
45. Calcule el ángulo entre \mathbf{t} y \mathbf{w}
46. Calcule $\text{proy}_{\mathbf{u}} \mathbf{v}$
47. Calcule $\text{proy}_{\mathbf{t}} \mathbf{w}$
48. Calcule $\mathbf{w} \text{ proy}_{\mathbf{t}} \mathbf{v}$
49. Pruebe el teorema 1. [Sugerencia: Utilice el teorema de Pitágoras dos veces en la figura 3.26.]

Figura 3.26



50. Pruebe el teorema 2.
51. Pruebe el teorema 3.
52. Pruebe el teorema 4.

RESPUESTAS A LA AUTOEVALUACIÓN

- I. V II. c) III. c) IV. d) V. d)
 VI. a) VII. c) VIII. a)



MANEJO DE LA CALCULADORA

Las instrucciones para calculadora presentadas en las secciones 3.1 y 3.2 para vectores en \mathbb{R}^2 se extienden a \mathbb{R}^3 , con la observación que ahora se tienen coordenadas esféricas además que cilíndricas y cartesianas para representar vectores.

Resuelva los siguientes problemas en una calculadora.

En los problemas 53 al 56 encuentre la magnitud y dirección de cada vector.

53. $(0.2316, 0.4179, -0.5213)$

54. $(-2356, -8194, 3299)$

55. $(17.3, 78.4, 28.6)$

56. $(0.0136, -0.0217, -0.0448)$

En los problemas 57 al 60 calcule $\text{proy}_{\mathbf{u}} \mathbf{v}$.

57. $\mathbf{u} = (-15, 27, 83)$; $\mathbf{v} = (-84, -77, 51)$

58. $\mathbf{u} = (-0.346, -0.517, -0.824)$; $\mathbf{v} = (-0.517, 0.811, 0.723)$

59. $\mathbf{u} = (5241, -3199, 2386)$; $\mathbf{v} = (1742, 8233, 9416)$

60. $\mathbf{u} = (0.24, 0.036, 0.055)$; $\mathbf{v} = (0.088, -0.064, 0.037)$

3.4 EL PRODUCTO CRUZ DE DOS VECTORES

Hasta el momento el único producto de vectores que se ha considerado ha sido el producto escalar o producto punto. Ahora se define un nuevo producto, llamado *producto cruz* (o *producto vectorial*), que está definido sólo en \mathbb{R}^3 .

Nota histórica. El producto cruz fue definido por Hamilton en uno de una serie de artículos publicados en *Philosophical Magazine* entre los años 1844 y 1850.

DEFINICIÓN 1

Producto cruz

Sean $\mathbf{u} = a_1\mathbf{i} + b_1\mathbf{j} + c_1\mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = a_2\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + c_2\mathbf{k}$. Entonces el **producto cruz** (**cruz vectorial**) de \mathbf{u} y \mathbf{v} , denotado por $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, es un nuevo vector definido por

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (b_1c_2 - c_1b_2)\mathbf{i} + (c_1a_2 - a_1c_2)\mathbf{j} + (a_1b_2 - b_1a_2)\mathbf{k} \quad (1)$$

Note que el resultado del producto cruz es un vector, mientras que el resultado del producto escalar es un escalar.

Aquí el producto cruz parece estar definido de una manera arbitraria. Es evidente que existen muchas maneras de definir un producto vectorial. ¿Por qué se escogió esta definición? La respuesta a esta pregunta se da en la presente sección demostrando algunas propiedades del producto cruz e ilustrando algunas de sus aplicaciones.

EJEMPLO 1

Cálculo del producto cruz de dos vectores

Sean $\mathbf{u} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$. Calcule $\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

■ **Solución** Usando la fórmula (1) se obtiene

$$\begin{aligned} \mathbf{w} &= [(-1)(-4) - (2)(3)]\mathbf{i} + [(2)(2) - (1)(-4)]\mathbf{j} + [(1)(3) - (-1)(2)]\mathbf{k} \\ &= -2\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + 5\mathbf{k} \end{aligned}$$

Nota. En este ejemplo $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = (\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}) \cdot (-2\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + 5\mathbf{k}) = -2 - 8 + 10 = 0$. De manera similar, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$. Es decir, $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal tanto a \mathbf{u} como a \mathbf{v} . Como se verá en breve, el producto cruz de \mathbf{u} y \mathbf{v} es siempre ortogonal a \mathbf{u} y \mathbf{v} .

Antes de continuar el estudio de las aplicaciones del producto cruz se observa que existe una forma sencilla de calcular $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ usando determinantes.

TEOREMA 1

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}^{\dagger}$$

DEMOSTRACIÓN

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} &= \mathbf{i} \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \\ &= (b_1c_2 - c_1b_2)\mathbf{i} + (c_1a_2 - a_1c_2)\mathbf{j} + (a_1b_2 - b_1a_2)\mathbf{k} \end{aligned}$$

que es igual a $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ según la definición 1.

EJEMPLO 2

Uso del teorema 1 para calcular un producto cruz

Calcule $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, donde $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = -3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$.

■ **Solución**

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 4 & -5 \\ -3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (4 - 10)\mathbf{i} - (2 - 15)\mathbf{j} + (-4 + 12)\mathbf{k} \\ &= -6\mathbf{i} + 13\mathbf{j} + 8\mathbf{k} \end{aligned}$$

El siguiente teorema resume algunas propiedades del producto cruz. Su demostración se deja como ejercicio (vea los problemas 38 al 41 de esta sección).

TEOREMA 2

Sean \mathbf{u} , \mathbf{v} y \mathbf{w} tres vectores en \mathbb{D}^3 y sea α un escalar, entonces:

- i. $\mathbf{u} \times \mathbf{0} = \mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$.
- ii. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$ (**propiedad anticonmutativa para el producto vectorial**).
- iii. $(\alpha\mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \alpha(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$.
- iv. $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$ (**propiedad distributiva para el producto vectorial**).
- v. $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$. (Esto se llama **triple producto escalar** de \mathbf{u} , \mathbf{v} y \mathbf{w} .)
- vi. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{0}$. (Es decir, $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal a \mathbf{u} y a \mathbf{v} .)
- vii. Si ni \mathbf{u} ni \mathbf{v} son el vector cero, entonces \mathbf{u} y \mathbf{v} son paralelos si y sólo si $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

[†] En realidad no se tiene un determinante porque \mathbf{i} , \mathbf{j} y \mathbf{k} no son números. Sin embargo, al usar la notación de determinantes, el teorema 1 ayuda a recordar cómo calcular un producto cruz.

Figura 3.27

Existen exactamente dos vectores, \mathbf{n} y $-\mathbf{n}$, ortogonales a dos vectores no paralelos \mathbf{u} y \mathbf{v} en \mathbb{R}^3





Figura 3.28

La dirección de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ se puede determinar usando la regla de la mano derecha



La parte *vi*) de este teorema es la que se usa con más frecuencia. Se vuelve a establecer como sigue:

El producto cruz $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal tanto a \mathbf{u} como a \mathbf{v} . ■

Se sabe que $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es un vector ortogonal a \mathbf{u} y \mathbf{v} , pero siempre habrá *dos* vectores unitarios ortogonales a \mathbf{u} y \mathbf{v} (vea la figura 3.27). Los vectores \mathbf{n} y $-\mathbf{n}$ (\mathbf{n} por la letra inicial de **normal**) son ambos ortogonales a \mathbf{u} y \mathbf{v} . ¿Cuál tiene la dirección de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$? La respuesta está dada por la **regla de la mano derecha**. Si se coloca la mano derecha de manera que el índice apunte en la dirección de \mathbf{u} y el dedo medio en la dirección de \mathbf{v} , entonces el pulgar apuntará en la dirección de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ (vea la figura 3.28).

Una vez que se ha estudiado la dirección del vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, la atención se dirige a su magnitud.

TEOREMA 3 Si φ es un ángulo entre \mathbf{u} y \mathbf{v} , entonces

$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \operatorname{sen} \varphi \quad (2)$$

DEMOSTRACIÓN

No es difícil demostrar (comparando coordenadas) que $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|^2 = |\mathbf{u}|^2 |\mathbf{v}|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$ (vea el problema 37). Entonces, como $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 = |\mathbf{u}|^2 |\mathbf{v}|^2 \cos^2 \varphi$ (del teorema 3.3.2, página 255),

$$\begin{aligned} |\mathbf{u} \times \mathbf{v}|^2 &= |\mathbf{u}|^2 |\mathbf{v}|^2 - |\mathbf{u}|^2 |\mathbf{v}|^2 \cos^2 \varphi = |\mathbf{u}|^2 |\mathbf{v}|^2 (1 - \cos^2 \theta) \\ &= |\mathbf{u}|^2 |\mathbf{v}|^2 \operatorname{sen}^2 \varphi \end{aligned}$$

y el teorema queda demostrado después de sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Observe que $\operatorname{sen} \varphi \geq 0$ porque $0 \leq \varphi \leq \pi$.

Existe una interpretación geométrica interesante del teorema 3. Los vectores \mathbf{u} y \mathbf{v} están dibujados en la figura 3.29 y se puede pensar que son dos lados adyacentes de un paralelogramo. Entonces de la geometría elemental, se ve que

$$\begin{aligned} \text{El área del paralelogramo que tiene lados adyacentes} \\ \mathbf{u} \text{ y } \mathbf{v} \text{ es igual a } |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \operatorname{sen} \varphi = |\mathbf{u} \times \mathbf{v}| \quad (3) \end{aligned}$$

Figura 3.29

ϕ es el ángulo entre \mathbf{u} y \mathbf{v} .
 $\frac{h}{v} = \text{sen } \phi$ de manera que
 $h = |v| \text{sen } \phi$





Figura 3.30

Un paralelogramo en \mathbb{R}^3



EJEMPLO 3 Cálculo del área de un paralelogramo en \mathbb{R}^3

Encuentre el área del paralelogramo con vértices consecutivos en $P = (1, 3, -2)$, $Q = (2, 1, 4)$ y $R = (-3, 1, 6)$ (ver figura 3.30).

■ **Solución**

El paralelogramo.

$$\begin{aligned} \text{Área} &= |\vec{PQ} \times \vec{QR}| = |(\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 6\mathbf{k}) \times (-5\mathbf{i} + 2\mathbf{k})| \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -2 & 6 \\ -5 & 0 & 2 \end{vmatrix} = |-4\mathbf{i} - 32\mathbf{j} - 10\mathbf{k}| = \sqrt{1140} \text{ unidades cuadradas.} \end{aligned}$$

INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DE LOS DETERMINANTES DE 2×2 (OTRA VEZ)

En la sección 2.1 se estudió el significado geométrico de un determinante de 2×2 (página 175). Ahora se observará el mismo problema. Haciendo uso del producto cruz se obtiene el resultado de la sección 2.1 en forma más sencilla. Sea A una matriz de 2×2 y sean \mathbf{u} y \mathbf{v} dos vectores de 2 componentes. Sean $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$. Estos vectores están dados en la figura 3.31.

El **área generada** por \mathbf{u} y \mathbf{v} se define como el área del paralelogramo dado en la figura. Se puede pensar que \mathbf{u} y \mathbf{v} son vectores en \mathbb{R}^3 que están en el plano xy . Entonces $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ 0 \end{pmatrix}$, y

$$\begin{aligned} \text{área generada por } \mathbf{u} \text{ y } \mathbf{v} &= |\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & 0 \\ v_1 & v_2 & 0 \end{vmatrix} \\ &= |(u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k}| = |u_1v_2 - u_2v_1|^\dagger \end{aligned}$$

Ahora sea $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $\mathbf{u}' = A\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}' = A\mathbf{v}$. Entonces $\mathbf{u}' = \begin{pmatrix} a_{11}u_1 + a_{12}u_2 \\ a_{21}u_1 + a_{22}u_2 \end{pmatrix}$ y $\mathbf{v}' = \begin{pmatrix} a_{11}v_1 + a_{12}v_2 \\ a_{21}v_1 + a_{22}v_2 \end{pmatrix}$. ¿Cuál es el área generada por \mathbf{u}' y \mathbf{v}' ? Siguiendo los pasos anteriores se calcula

† Observe que éste es el valor absoluto de $\det \begin{pmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{pmatrix}$.

Figura 3.31

El área de la región sombreada es el área generada por \mathbf{u} y \mathbf{v}





Figura 3.32

Tres vectores \mathbf{u} , \mathbf{v} y \mathbf{w} , que no están en el mismo plano determinará un paralelepípedo en \mathbb{R}^3



$$\begin{aligned} \text{Área generada por } \mathbf{u}' \text{ y } \mathbf{v}' &= |\mathbf{u}' \times \mathbf{v}'| = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_{11}u_1 + a_{12}u_2 & a_{21}u_1 + a_{22}u_2 & 0 \\ a_{11}v_1 + a_{12}v_2 & a_{21}v_1 + a_{22}v_2 & 0 \end{vmatrix} \\ &= |(a_{11}u_1 + a_{12}u_2)(a_{21}v_1 + a_{22}v_2) - (a_{21}u_1 + a_{22}u_2)(a_{11}v_1 + a_{12}v_2)| \end{aligned}$$

La manipulación algebraica verifica que la última expresión es igual a

$$|(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})(u_1v_2 - u_2v_1)| = \pm \det A \text{ (área generada por } \mathbf{u} \text{ y } \mathbf{v})$$

Entonces (en este contexto): *el determinante tiene el efecto de multiplicar el área*. En el problema 45 se pide al lector que demuestre que de cierta forma un determinante de 3×3 tiene el efecto de multiplicar el volumen.

INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DEL TRIPLE PRODUCTO ESCALAR

Sean \mathbf{u} , \mathbf{v} y \mathbf{w} tres vectores que no están en el mismo plano. Entonces forman los lados de un **paralelepípedo** en el espacio (vea la figura 3.32). Calculemos su volumen. La base del paralelepípedo es un paralelogramo. Su área, de (3), es igual a $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|$.

El vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal tanto a \mathbf{u} como a \mathbf{v} y, por lo tanto, es ortogonal al paralelogramo determinado por \mathbf{u} y \mathbf{v} . La altura del paralelepípedo, h , se mide a lo largo del vector ortogonal al paralelogramo.

Del análisis de la proyección en la página 238, se ve que h es el valor absoluto de la componente de \mathbf{w} en la dirección (ortogonal) $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$. Así, de la ecuación (10) en la página 251

$$h = \text{componente de } \mathbf{w} \text{ en la dirección } \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \frac{|\mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})|}{|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|}$$

Entonces

Volumen del paralelepípedo = área de base \times altura

$$= |\mathbf{u} \times \mathbf{v}| \left[\frac{|\mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})|}{|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|} \right] = |\mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})|$$

Es decir,

El volumen del paralelepípedo determinado por los tres vectores \mathbf{u} , \mathbf{v} y \mathbf{w} es igual a $|(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}|$ = valor absoluto del triple producto escalar de \mathbf{u} , \mathbf{v} y \mathbf{w} . (4)

SEMBLANZA DE...

Josiah Willard Gibbs y los orígenes del análisis vectorial (1839-1903)


Como se ha observado anteriormente, el estudio de los vectores se originó con la invención de los cuaterniones de Hamilton. Hamilton y otros desarrollaron los cuaterniones como herramientas matemáticas para la exploración del espacio físico. Pero los resultados fueron decepcionantes porque vieron que los cuaterniones eran demasiado complicados para entenderlos con rapidez y aplicarlos fácilmente. Los científicos se dieron cuenta de que muchos problemas se podían manejar considerando la parte vectorial por separado y de este modo comenzó el análisis vectorial.

Este trabajo se debe principalmente al físico americano Josiah Willard Gibbs (1839-1903). Como nativo de New Haven, Connecticut, Gibbs estudió matemáticas y física en la Universidad de Yale y recibió el grado de doctor en 1863. Posteriormente estudió matemáticas y física en París, Berlín y Heidelberg. En 1871, fue nombrado profesor de física en Yale. Era un físico original que realizó muchas publicaciones en el área físico-matemática. El libro de Gibbs *Vector Analysis* apareció en 1881 y de nuevo en 1884. En 1902 publicó *Elementary Principles of Statistical Mechanics*. Los estudiantes de matemáticas aplicadas se encontraron con el singular **fenómeno de Gibbs** en las series de Fourier.

El libro pionero de Gibbs, *Vector Analysis* era en realidad un panfleto pequeño impreso para la distribución privada—en principio para que sus estudiantes lo usaran—. De cualquier forma, creó un gran entusiasmo entre aquellos que veían una alternativa a los cuaterniones, por lo que pronto el libro fue ampliamente difundido. Finalmente, el material se convirtió en un libro formal escrito por E. B. Wilson. El libro *Vector Analysis* de Gibbs y Wilson se basaba en la cátedra de Gibbs. Se publicó en 1901.

Todos los estudiantes de física elemental se encuentran con el trabajo de Gibbs. En la introducción a la física, un espacio vectorial se ve como un segmento de recta dirigido, o flecha. Gibbs dio definiciones de igualdad, suma y multiplicación de vectores; éstas son esencialmente las definiciones dadas en este capítulo. En particular, la parte vectorial de un cuaternión se escribía como $ai + bj + ck$, y ésta es la forma en que ahora se describen los vectores en \mathbb{R}^3 .

Gibbs definió el producto escalar, inicialmente sólo para los vectores i, j, k :



$$i \cdot i = j \cdot j = k \cdot k = 1$$

$$i \cdot j = j \cdot i = i \cdot k = k \cdot i = j \cdot k = k \cdot j = 0$$

Siguió a esto la definición más general. Gibbs aplicó el producto escalar en problemas referentes a la fuerza (recuerde, primero era físico). Si \mathbf{F} es un vector de fuerza de magnitud $|\mathbf{F}|$ que actúa en la dirección del segmento \overrightarrow{OQ} (vea la figura 3.33), entonces, la efectividad de esta fuerza al empujar un objeto a lo largo del segmento \overrightarrow{OP} (es decir, a lo largo del vector \mathbf{u}) está dada por $\mathbf{F} \cdot \mathbf{u}$.




Figura 3.33 La efectividad de \mathbf{F} en la dirección de \overrightarrow{OP} es la componente de \mathbf{F} en la dirección de \overrightarrow{OP} ($= \mathbf{u}$) si $\mathbf{u} = 1$

Si $|\mathbf{u}| = 1$, entonces $\mathbf{F} \cdot \mathbf{u}$ es la componente de \mathbf{F} en la dirección de \mathbf{u} . También el producto cruz tiene un significado físico. Suponga que un vector de fuerza \mathbf{F} actúa en un punto P en el espacio en la dirección de \overrightarrow{PQ} . Si \mathbf{u} es el vector representado por \overrightarrow{OP} , entonces el momento de fuerza ejercido por \mathbf{F} alrededor del origen es el vector $\mathbf{u} \times \mathbf{F}$ (vea la figura 3.34).




Figura 3.34 El vector $\mathbf{u} \times \mathbf{F}$ es el momento de la fuerza alrededor del origen

Tanto el producto escalar como el producto cruz entre vectores aparecen frecuentemente en las aplicaciones físicas que involucran el cálculo de varias variables. Éstas incluyen las famosas ecuaciones de Maxwell en electromagnetismo.

Al estudiar matemáticas al final del siglo xx, no debemos perder de vista el hecho de que la mayor parte de las matemáticas modernas se desarrollaron para resolver problemas del mundo real. Los vectores fueron desarrollados por Gibbs y otros para facilitar el análisis de los fenómenos físicos. En ese sentido tuvieron un gran éxito.

Problemas 3.4

AUTOEVALUACIÓN

I. $\mathbf{i} \times \mathbf{k} - \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \underline{\hspace{2cm}}$.

- a) 0 b) \mathbf{j} c) $2\mathbf{j}$ d) $-2\mathbf{j}$

II. $\mathbf{i} \cdot (\mathbf{j} \times \mathbf{k}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

- a) 0 b) $\mathbf{0}$ c) 1 d) $\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$

III. $\mathbf{i} \times \mathbf{j} \times \mathbf{k} \underline{\hspace{2cm}}$.

- a) 0 b) $\mathbf{0}$ c) 1 d) no está definido

IV. $(\mathbf{i} + \mathbf{j}) \times (\mathbf{j} + \mathbf{k}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

- a) 0 b) $\mathbf{0}$ c) 1 d) $\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$

V. El seno del ángulo entre los vectores \mathbf{u} y \mathbf{w} es $\underline{\hspace{2cm}}$.

- a) $\frac{|\mathbf{u} \times \mathbf{w}|}{|\mathbf{u}||\mathbf{w}|}$ b) $\frac{|\mathbf{u} \times \mathbf{w}|}{|\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}|}$
 c) $\frac{|\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}|}{|\mathbf{u} \times \mathbf{w}|}$ d) $|\mathbf{u} \times \mathbf{w}| - |\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}|$

VI. $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \underline{\hspace{2cm}}$.

- a) $|\mathbf{u}|^2$ b) 1 c) 0 d) $\mathbf{0}$

En los problemas 1 al 26 encuentre el producto cruz $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

1. $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j}; \mathbf{v} = 3\mathbf{k}$
2. $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - 7\mathbf{j}; \mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{k}$
3. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j}; \mathbf{v} = -9\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$
4. $\mathbf{u} = \mathbf{i} - \mathbf{j}; \mathbf{v} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$
5. $\mathbf{u} = -7\mathbf{k}; \mathbf{v} = \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$
6. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - 7\mathbf{k}; \mathbf{v} = -3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$
7. $\mathbf{u} = -2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}; \mathbf{v} = 7\mathbf{i} + 4\mathbf{k}$
8. $\mathbf{u} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}; \mathbf{v} = c\mathbf{i} + d\mathbf{j}$
9. $\mathbf{u} = a\mathbf{i} + b\mathbf{k}; \mathbf{v} = c\mathbf{i} + d\mathbf{k}$
10. $\mathbf{u} = a\mathbf{j} + b\mathbf{k}; \mathbf{v} = c\mathbf{i} + d\mathbf{k}$
11. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \mathbf{k}; \mathbf{v} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$
12. $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 2\mathbf{k}; \mathbf{v} = 6\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$
13. $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}; \mathbf{v} = -\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - \mathbf{k}$
14. $\mathbf{u} = -3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}; \mathbf{v} = 6\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$
15. $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 7\mathbf{j} - 3\mathbf{k}; \mathbf{v} = -\mathbf{i} - 7\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$
16. $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 7\mathbf{j} - 3\mathbf{k}; \mathbf{v} = -\mathbf{i} + 7\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$
17. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 5\mathbf{k}; \mathbf{v} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}$
18. $\mathbf{u} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}; \mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$
19. $\mathbf{u} = 10\mathbf{i} + 7\mathbf{j} - 3\mathbf{k}; \mathbf{v} = -3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$
20. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 6\mathbf{k}; \mathbf{v} = -\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$
21. $\mathbf{u} = -\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 5\mathbf{k}; \mathbf{v} = -2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 8\mathbf{k}$
22. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}; \mathbf{v} = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$
23. $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + 8\mathbf{k}; \mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - 4\mathbf{k}$
24. $\mathbf{u} = a\mathbf{i} + a\mathbf{j} + a\mathbf{k}; \mathbf{v} = b\mathbf{i} + b\mathbf{j} + b\mathbf{k}$
25. $\mathbf{u} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}; \mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} - c\mathbf{k}$
26. $\mathbf{u} = -4\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 5\mathbf{k}; \mathbf{v} = -\mathbf{i} - 3\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$
27. Encuentre dos vectores unitarios ortogonales tanto a $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$ como a $\mathbf{v} = 4\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$.
28. Encuentre dos vectores unitarios ortogonales tanto a $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ como a $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}$.
29. Utilice el producto cruz para encontrar el seno del ángulo ϕ entre los vectores $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = -3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$.
30. Utilice el producto escalar para calcular el coseno del ángulo ϕ entre los vectores del problema 29. Después demuestre que para los valores calculados, $\sin^2 \phi + \cos^2 \phi = 1$.

En los problemas 31 al 36 encuentre el área del paralelogramo con los vértices adyacentes dados.

31. $(1, -2, 3); (2, 0, 1); (0, 4, 0)$
32. $(-2, 1, 1); (2, 2, 3); (-1, -2, 4)$
33. $(-2, 1, 0); (1, 4, 2); (-3, 1, 5)$
34. $(7, -2, -3); (-4, 1, 6); (5, -2, 3)$
35. $(a, 0, 0); (0, b, 0); (0, 0, c)$
36. $(a, b, 0); (a, 0, b); (0, a, b)$
37. Demuestre que $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|^2 = |\mathbf{u}|^2 |\mathbf{v}|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$. [Sugerencia: Escríbalo en términos de componentes.]
38. Utilice las propiedades 1, 4, 2 y 3 (en ese orden) en la sección 2.2 para probar las partes i), ii), iii) y iv) del teorema 2.
39. Pruebe el teorema 2 parte v) escribiendo las componentes de cada lado de la igualdad.
40. Pruebe el teorema 2 parte vi). [Sugerencia: Utilice las partes ii) y v) y el hecho de que el producto escalar es conmutativo para demostrar que $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = -\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})$.]
41. Pruebe el teorema 2 parte vii). [Sugerencia: Use el teorema 3.3.3, pág. 250, la propiedad 6, pág. 190 y la ecuación (2).]
42. Demuestre que si $\mathbf{u} = (a_1, b_1, c_1)$, $\mathbf{v} = (a_2, b_2, c_2)$ y $\mathbf{w} = (a_3, b_3, c_3)$, entonces

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

43. Calcule el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores $\mathbf{i} - \mathbf{j}$, $3\mathbf{i} + 2\mathbf{k}$, $-7\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$.
44. Calcule el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores \vec{PQ} , \vec{PR} y \vec{PS} , donde $P = (2, 1, -1)$, $Q = (-3, 1, 4)$, $R = (-1, 0, 2)$ y $S = (-3, -1, 5)$.
- **45. El **volumen generado** por tres vectores \mathbf{u} , \mathbf{v} y \mathbf{w} en \mathbb{R}^3 está definido como el volumen del paralelepípedo cuyos lados son \mathbf{u} , \mathbf{v} y \mathbf{w} (como en la figura 3.32). Sea A una matriz de 3×3 y sean $\mathbf{u}_1 = A\mathbf{u}$, $\mathbf{v}_1 = A\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}_1 = A\mathbf{w}$ demuestre que

$$\text{Volumen generado por } \mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1, \mathbf{w}_1 = (\pm \det A)(\text{volumen generado por } \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}).$$

Esto muestra que el determinante de una matriz de 2×2 multiplica el área, el determinante de una matriz de 3×3 multiplica el volumen.

46. Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \end{pmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ y $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

- a) Calcule el volumen generado por \mathbf{u} , \mathbf{v} y \mathbf{w} .
- b) Calcule el volumen generado por $A\mathbf{u}$, $A\mathbf{v}$ y $A\mathbf{w}$.
- c) Calcule $\det A$.
- d) Demuestre que [volumen en el inciso b)] = $(\pm \det A) \times$ [volumen en el inciso a)].
47. El **triple producto cruz** de tres vectores en \mathbb{R}^3 está definido como el vector $\mathbf{v} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$. Demuestre que

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$$

RESPUESTAS A LA AUTOEVALUACIÓN

- I. d) II. c) III. b) = vector cero [Nota: $\mathbf{i} \times \mathbf{j} \times \mathbf{k}$ está definido porque $(\mathbf{i} \times \mathbf{j}) \times \mathbf{k} = \mathbf{0} = \mathbf{i} \times (\mathbf{j} \times \mathbf{k})$]
- IV. d) V. a) VI. c) = vector cero



MANEJO DE LA CALCULADORA

El producto cruz de dos vectores se puede encontrar directamente utilizando el comando CROSS, esto es

$$\leftarrow [I] \quad [3] \quad [SPC] \quad [5] \quad [ENTER]$$

$$\leftarrow [I] \quad [5] \quad [ALPHA] \quad [6] \quad [3] \quad [ENTER]$$

$$[ALPHA] [ALPHA] [C] [R] [O] [S] [S] [ENTER]$$

En los problemas 48 al 51 calcule $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ con calculadora.

48. $\mathbf{u} = (-15, 27, 83)$; $\mathbf{v} = (-84, -77, 51)$
49. $\mathbf{u} = (-0.346, -0.517, -0.824)$; $\mathbf{v} = (-0.517, 0.811, 0.723)$
50. $\mathbf{u} = (5241, -3199, 2386)$; $\mathbf{v} = (1742, 8233, 9416)$
51. $\mathbf{u} = (0.024, 0.036, 0.055)$; $\mathbf{v} = (0.088, -0.064, 0.037)$